► Функция $f(x)$ называется возрастающей на промежутке X , если для любых $x_1, x_2 \in X$, таких что $x_1 < x_2$, выполнено $f(x_1) < f(x_2)$.

Примеры. $y = \sqrt{x}$, $y = 2^x$, $y = \log_2 x$, $y = x^3$.

Функция называется неубывающей на промежутке X , если для любых $x_1, x_2 \in X$, таких что $x_1 < x_2$, выполнено $f(x_1) \leq f(x_2)$.

► Функция $f(x)$ называется убывающей на промежутке X , если для любых $x_1, x_2 \in X$, таких что $x_1 < x_2$, выполнено $f(x_1) > f(x_2)$.

Примеры. $y = \log_{0,5} x$, $y = (0,5)^x$, $y = \sqrt{-x}$.

Функция называется невозрастающей на промежутке X , если для любых $x_1, x_2 \in X$, таких что $x_1 < x_2$, выполнено $f(x_1) \geq f(x_2)$.

► Возрастающие и убывающие функции называют строго монотонными, а невозрастающие и неубывающие — просто монотонными.

Краткий справочник

<p>Если производная положительна на промежутке $(a; b)$,</p> <p style="text-align: center;">$y = f'(x)$</p>	<p>то функция возрастает на промежутке $(a; b)$</p> <p style="text-align: center;">$y = f(x)$</p>
<p>Если производная отрицательна на промежутке $(a; b)$,</p> <p style="text-align: center;">$y = f'(x)$</p>	<p>то функция убывает на промежутке $(a; b)$</p> <p style="text-align: center;">$y = f(x)$</p>
<p>Если производная равна нулю в точке $x = a$, причем меняет знак с “плюса” на “минус”, если смотреть слева направо,</p> <p style="text-align: center;">$y = f'(x)$</p> <p style="text-align: center;">a</p>	<p>то точка $x = a$ является точкой максимума функции</p> <p style="text-align: center;">$y = f(x)$</p> <p style="text-align: center;">a</p>
<p>Если производная равна нулю в точке $x = a$, причем меняет знак с “минуса” на “плюс”, если смотреть слева направо,</p> <p style="text-align: center;">$y = f'(x)$</p> <p style="text-align: center;">a</p>	<p>то точка $x = a$ является точкой минимума функции</p> <p style="text-align: center;">$y = f(x)$</p> <p style="text-align: center;">a</p>

► Основные свойства:

- 1 Сумма возрастающих функций – возрастающая функция;
сумма убывающих функций – убывающая функция;
если $f(x)$ – возрастающая функция, то $-f(x)$ – убывающая функция;
если $f(x)$ – возрастающая функция, то $f(x) + c$ – возрастающая функция (c – некоторое число).

Пример. Функция $f(x) = x^3 + x^2 + x$ монотонно возрастает, так как ее производная $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1 > 0$ при $\forall x \in \mathbb{R}$. Функция $t(x) = 2^x$ монотонно возрастает.

Следовательно, функция $g(x) = -f(x) = -x^3 - x^2 - x$ монотонно убывает,
функция $h(x) = f(x) + 1 = x^3 + x^2 + x + 1$ монотонно возрастает, как и $f(x)$,
функция $k(x) = f(x) + t(x) = x^3 + x^2 + x + 2^x$ монотонно возрастает.

- 2 Если $f(x), g(x)$ – возрастающие функции, а $h(x), p(x)$ – убывающие (на некотором множестве), то $f(g(x))$ – возрастающая, $f(h(x))$ – убывающая, $h(f(x))$ – убывающая, $h(p(x))$ – возрастающая.

Иными словами: композиция двух функций одинаковой монотонности – возрастающая, разной монотонности – убывающая.

Пример. Функция $f(x) = \sin x$ возрастает на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, функция $t(x) = x^2$ возрастает при $x \geq 0$. Следовательно, функция $g(x) = f(t(x)) = \sin x^2$ возрастает на $[0; \frac{\pi}{2}]$.

- 3 Если $f(x)$ – возрастающая и знакопостоянная на некотором множестве (либо строго положительна, либо строго отрицательна), то $\frac{1}{f(x)}$ – убывающая.

Аналогично: если $f(x)$ убывает и знакопостоянна, то $\frac{1}{f(x)}$ возрастает.

Пример. Функция $f(x) = x$ возрастает и положительна при $x > 0$.

Следовательно, функция $g(x) = \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{x}$ убывает при $x > 0$.

- 4 Если $f(x), g(x)$ – возрастающие неотрицательные/неположительные функции, то $f(x) \cdot g(x)$ – возрастающая/убывающая соответственно. Аналогично с убывающими.

Пример. Функции $f(x) = x^3$ и $g(x) = -x^2$ возрастают и неположительны при $x \leq 0$.

Следовательно, функция $h(x) = f(x) \cdot g(x) = -x^5$ убывает при $x \leq 0$.

- 5 Если функция $f(x)$ – строго монотонна на X , то равенства $x_1 = x_2$ ($x_1, x_2 \in X$) и $f(x_1) = f(x_2)$ равносильны.

Если $f(x)$ возрастает на X , то $x_1 > x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Если $g(x)$ убывает на X , то $x_1 > x_2 \Leftrightarrow g(x_1) < g(x_2)$.

Пример. Функция $f(x) = \sqrt{x}$ является строго возрастающей при всех $x \in [0; +\infty)$, поэтому из равенства $\sqrt{x} = \sqrt{4}$ следует $x = 4$.

- 6 Если функция $f(x)$ – строго монотонна на X , то уравнение $f(x) = c$, где c – некоторое число, всегда имеет не более одного решения на X .

Примеры.

1) функция $f(x) = x^2$ является строго убывающей при $x \in (-\infty; 0]$, поэтому уравнение $x^2 = 9$ имеет на этом промежутке не более одного решения, а точнее одно: $x = -3$.

2) функция $f(x) = -\frac{1}{x+1}$ является строго возрастающей при $x \in (-1; +\infty)$, поэтому уравнение $-\frac{1}{x+1} = 0$ имеет на этом промежутке не более одного решения, а точнее ни одного, так как числитель дроби в левой части никогда не может быть равен нулю.

- 7 Если на $[a; b]$ функция $f(x)$ – возрастающая, а $g(x)$ – убывающая, то уравнение $f(x) = g(x)$ на $[a; b]$ имеет не более одного корня.

Пример. Функция $f(x) = x^2$ является возрастающей на $[0; +\infty)$, а функция $g(x) = -x + 5$ – убывающей, следовательно, уравнение $x^2 = -x + 5$ имеет на $[0; +\infty)$ не более одного корня. В данном случае – ровно один корень.

- 8 Если функция $f(x)$ – не убывает (не возрастает) и непрерывна на отрезке $[a; b]$, причем на концах отрезка она принимает значения $f(a) = A, f(b) = B$, то при $C \in [A; B]$ ($C \in [B; A]$) уравнение $f(x) = C$ всегда имеет хотя бы одно решение.

Пример. Функция $f(x) = x^3$ является строго возрастающей (то есть строго монотонной) и непрерывной при всех $x \in \mathbb{R}$, поэтому при любом $C \in (-\infty; +\infty)$ уравнение $x^3 = C$ имеет ровно одно решение: $x = \sqrt[3]{C}$.